

午膳食品分類表

使用指引

建議校內的膳食小組或負責學童膳食的老師，在收到由午膳供應商提供的餐單後，參考以下步驟進行審批，並與供應商溝通改良餐單，令學生的午膳更健康。

步驟：

一、 去除「紅燈」食品

應剔除餐單內所有「強烈不鼓勵供應食品」，確保所有餐款沒有供應此類「紅燈」食品。分類詳情請參閱《學生午膳營養指引》第十二及第十九頁。

較容易被忽略的「紅燈」食品包括：

- 芡汁（如以椰漿或椰汁製成的咖喱／葡汁、以忌廉製成的白汁）
- 預先經過油炸處理的食品（如魚腐、伊麵、經油炸處理的枝竹等）
- 含反式脂肪的食品（如酥皮麵包）

二、 留意一週內「黃燈」食品的出現次數

找出「限制供應食品」，並確保每週不多於兩天供應此類「黃燈」食品。有關此類食品的分類詳情，請參閱《學生午膳營養指引》第十一及第十八頁。

三、 核實「綠燈」食品的出現次數

視乎學校午膳提供五穀類的情況，

- 如每天供應一款以上的五穀類，則每天須在最少一款午膳款式中提供「鼓勵多供應食品」（「綠燈」食品）；
- 如每天只供應一款五穀類，則每週須在最少兩個上課天提供「鼓勵多供應食品」。

有關此類食品的分類詳情，請參閱《學生午膳營養指引》第十及第十七頁。

| 類別 | 準則 | 食物例子 |
|--|---|--|
| <p>鼓勵多供應的食品¹ 如每天供應一款以上的五穀類，須每天在最少一款午膳款式中提供此類食品；如每天只供應一款五穀類，須每週最少兩個上課天向學生提供此類食品</p> | <ul style="list-style-type: none"> 全穀麥或添加蔬菜的五穀類 | <p>紅米飯、糙米飯、菜飯、五穀飯、粟米飯、蘑菇飯、麥包、薏米飯、蕎麥麵</p> |
| <p>限制供應的食品 每週(四或五個上課天)不多於兩個上課天向學生供應此類食品； 如一週只有兩至三個上課天，便不應多於一天供應； 如一週只得一個上課天，便不應供應</p> | <ul style="list-style-type: none"> 添加了脂肪、油分的五穀類 脂肪比例較高的肉類及連皮的禽肉 全脂奶品類 加工或醃製的肉類、蛋類及蔬菜類食品 高鹽分或高脂肪醬汁或芡汁³ | <p>炒飯²、炒麵²、油麵、薄餅(不含紅色食材) 牛腩、牛肋骨、排骨、豬頸肉、豬軟骨、連皮的雞、鴨和鵝(如雞翼、雞脾、雞翅等，但雞腳除外⁵) 全脂奶、全脂芝士、全脂乳酪、各種淡奶 玉子豆腐、叉燒、煙肉、鴨胸肉、火腿、香腸、午餐肉、牛丸、白魚蛋、貢丸、雪菜、榨菜、豆豉、素肉、蟹柳、五香豆干、現成點心(如燒賣、菜肉包、牛肉球、潮州粉果等)、油浸罐頭吞拿魚、罐頭湯 芡汁或醬料：豉汁、照燒汁、瑞士汁、茄汁(Ketchup)、白汁或卡邦尼汁(以全脂奶或各種淡奶製成)、葡汁或咖喱(以全脂奶或各種淡奶製成)、鹵水汁、南乳、腐乳、麵醬、馬拉盞、蝦醬、柱候醬、豉油皇、梅子、味噌、豆瓣醬</p> |
| <p>強烈不鼓勵供應的食品 (所有午膳款式不應提供此類食品)</p> | <ul style="list-style-type: none"> 油炸食物 添加了動物脂肪或植物性飽和脂肪 添加反式脂肪的食物 「少選為佳」的飲品⁴ 鹽分極高的食品 | <p>炸豬扒、炸薯條、炸雞脾、春卷、咖喱角、豆卜、炸魚蛋、炸麵筋、炸枝竹、炸魚柳、炸魚腐、炸花生、伊麵、含油條的食物(如餐飯)、紅燒豆腐、炸雞腳⁵ 食油：牛油(包括較低脂牛油)、豬油、忌廉(包括較低脂忌廉)、棕櫚油、椰子油 食物：菠蘿油、菠蘿包、雞尾包、椰檳、酥皮蛋撻、蛋撻、曲奇、蛋卷、夾心餅、牛角包、牛油餐包(額外添加牛油)、其他以椰漿/椰汁製成的食物、鬆餅(scone和muffin) 芡汁：白汁或卡邦尼汁(以忌廉製成)、葡汁或咖喱汁或沙爹醬(以椰漿/椰汁製成) 添加了以下食油的食物：氫化植物油、含反式脂肪的植物牛油和起酥油</p> |

1. 由於學童的發育及成長需要大量鈣質，鼓勵午膳供應商多選鈣質豐富的食物作用料。可是，由於適合製作午餐餐盒的鈣質豐富食材有限，家長應多為子女於午膳以外的時供應鈣質豐富的食物

2. 指在烹煮過程中添加多於兩茶匙油(一人分量計)的飯及麵類食品

3. 建議減少加入高鹽分或高脂肪醬汁或芡汁，並把醬汁或芡汁分開供應

4. 請參考《學生小食營養指引》內「少選為佳」的飲品例子

5. 雞腳，無論油炸與否，均屬「強烈不鼓勵供應」的食品，因其主要營養成分為脂肪

